ANAPHYLAXIE ERKENNEN

BEGINNENDE REAKTION:

ANZEICHEN:

- Kratzen im Hals
- Schwellungen von Lippe, Gesicht
- Jucken an Handflächen, Fußsohlen,
- Quaddeln, Nesselausschlag
- Hautrötungen
- Übelkeit, Erbrechen
- Unbestimmtes Angstgefühl

HANDLUNGSMASSNAHMEN:

1. Notarzt verständigen
2. Antihistaminikum und Kortison nach Vorgaben verabreichen.
3. Epinephrin Autoinjektor bereit halten



SCHWERER REAKTION

ALLERTOONS

ANZEICHEN:

Eine schwere Reaktion erkennt man am gleichzeitigen Auftreten von zwei oder mehr Symptomen an verschiedenen Organen (zB. Erbrechen und Hautrötungen). Ausserdem: |

Plötzliche Heiserkeit * Husten * Atemnot * Schwindel

HANDLUNGSMASSNAHMEN:

1. Epinephrin Autoinjektor in den seitlichen Oberschenkel injizieren (siehe Hersteller Angaben)
2. Patientenlagerung (bei Atemnot: hinsetzen, bei Kreislaufbeschwerden hinlegen)
   bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage
3. Weitere Medikamente nach Angaben verabreichen
4. Notarzt verständigen!